Muhtasari (Mfululizo 2.1b)
Saratani ya figo kwa watoto / WCF
Ugonjwa, dalili, matibabu na msaada



Wakfu wa Saratani ya Wilms

Shirika lisilotozwa kodi chini ya 501(c)(3) (EIN: 98-3478827)
712 H Street NE, Suite 2147, Washington DC, Marekani, 20002

info@WilmsFoundation.org | +1 (778) 514 5000

© Shirika la Afya Duniani (WHO). Imetumika kwa ruhusa kwa kushirikiana na Wakfu wa Saratani ya Wilms (WCF). CureAll ni sehemu ya Mpango wa Kimataifa wa WHO wa Saratani za Watoto (GICC). WHO haiidhinishi shirika, bidhaa au huduma yoyote mahususi.

www.WilmsFoundation.org



Wakfu wa Saratani ya Wilms

Kushinda Saratani ya Figo kwa Watoto

Ugonjwa

Nefroblastoma (inayojulikana kama uvimbe wa Wilms) ndiyo saratani ya figo inayowapata watoto zaidi, na ni saratani ya nne kwa wingi kwa watoto kwa ujumla.

Mara nyingi Wilms huwapata watoto wenye umri hadi miaka mitano, lakini pia inaweza kuwapata watoto wakubwa, vijana na wakati mwingine watu wazima.

Uvimbe huanza kukua kwenye figo, lakini baadaye huwa mkubwa kuliko figo yenyewe. Kwa kawaida, uvimbe na figo huhitaji kuondolewa. Katika hatua za baadaye, Wilms inaweza kusambaa hadi mapafuni, kwenye ini na mifupa, na inaweza kusababisha kifo.

Uwezekano wa kuishi ni mzuri ikigunduliwa mapema. Hata hivyo, watoto wengi hukaa miaka bila utambuzi, wakipata matokeo mabaya na kuhitaji matibabu makubwa yanayohatarisha maisha, kama dawa za saratani, mionzi au upasuaji.



Msaada

Ni vyema matibabu ya Wilms yasimamiwe katika kituo cha saratani za watoto au programu maalumu ya uvimbe wa figo. Matibabu sahihi ni muhimu: viwango vya kuishi huzidi 85-90% katika programu zilizoendelea, na matokeo ni bora zaidi katika vituo maalumu. Familia zinapaswa kuwasiliana mara moja na timu yao ya matibabu zikishuku uvimbe wa Wilms.

Dalili

Mara nyingi Wilms huwapata watoto wa miaka 3-4, lakini pia inaweza kuwapata vijana na wakati mwingine watu wazima.

Uvimbe huanza kwenye figo, kisha hukua na kuwa mkubwa kuliko figo yenyewe. Kwa kawaida, uvimbe na figo huhitaji kuondolewa. Katika hatua za baadaye, Wilms inaweza kusambaa hadi mapafuni, kwenye ini na mifupa, na inaweza kusababisha kifo.

Dalili za Wilms hutofautiana. Kwa watoto wengi, uvimbe hugunduliwa kabla dalili hazijawa kali. Dalili ya kawaida ni uvimbe au donge tumboni lisilo na maumivu, ambalo wazazi huliona wanapomwogesha au kumvalisha mtoto.

Dalili nyingine ni maumivu ya tumbo, homa, uchovu, kukosa hamu ya kula au kupungua uzito. Baadhi ya watoto hupata shinikizo la juu la damu kwa sababu uvimbe huathiri utendaji wa figo. Wengine huwa na damu kwenye mkojo au mabadiliko ya kukojoa.

Kwa nadra, saratani ikisambaa mapafuni, mtoto anaweza kuwa na kikohozi kisichoisha, upungufu wa pumzi au dalili nyingine. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa ya kawaida ya utotoni. Hivyo, tathmini ya haraka ya kitabibu kwa dalili zisizo za kawaida au zisizoisha ni muhimu kwa utambuzi wa mapema.



Matibabu

Ugonjwa huu hutibika kwa urahisi zaidi ukigunduliwa mapema. Ukigunduliwa baadaye, matibabu huwa tata na makubwa, wakati mwingine yakidumu miaka na kuhusisha dawa za saratani, mionzi na upasuaji.



Matibabu ya Wilms hupangwa kwa makini kulingana na kila mtoto. Kwa kawaida, timu ya saratani za watoto hutoa mchanganyiko wa tiba. Msingi wake ni upasuaji, mara nyingi kuondoa figo iliyoathirika pamoja na uvimbe (nefrectomy).

Dawa za saratani hutolewa kuua seli zilizobaki baada ya upasuaji, au kabla yake ili kupunguza uvimbe na kuufanya uondolewe kwa usalama zaidi. Aina ya dawa na muda wa matibabu hutegemea hatua ya saratani na aina ya tishu za uvimbe. Mionzi hutumika katika hali zenye hatari zaidi, kama hatua zilizoendelea au aina ya tishu yenye ubashiri mbaya, ili kupunguza hatari ya saratani kurudi.

Wakfu wa Saratani ya Wilms (WCF) ni shirika la hisani linalosaidia na kuwakilisha watoto, familia na mashirika ya afya yaliyoathiriwa na saratani ya figo kwa watoto. Mwongozo huu ni kwa elimu pekee. Unategemea viwango vya kimataifa vya saratani za watoto vya Kanada, Marekani na Ulaya.

www.WilmsFoundation.org

+1 (778) 514 5000 | info@WilmsFoundation.org