Uvimbe wa Wilms

Saratani ya Figo kwa Watoto

Uhamasishaji: Ugonjwa, Dalili, Matibabu, Msaada





Wakfu wa Saratani ya Wilms (WCF)

Wakfu wa Saratani ya Wilms (WCF) ni shirika la hisani linalosaidia na kuwakilisha watoto, familia na mashirika ya afya yaliyoathiriwa na saratani ya figo kwa watoto (hasa nefroblastoma, inayojulikana kama Wilms). Dhamira yake ni kuanzisha mpango wa kimataifa wa uhamasishaji, elimu, utetezi, utambuzi wa mapema, matibabu na msaada ili kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa huu.

Mwongozo huu wa WCF ni kwa elimu pekee. Unategemea viwango vya kimataifa vya saratani za watoto vya Kanada, Marekani na Ulaya. Tafuta ushauri wa mtaalamu wa afya mwenye sifa ikiwa una wasiwasi au maswali.

© Hakimiliki | Wakfu wa Saratani ya Wilms | Haki Zote Zimehifadhiwa

Yaliyomo

Uhamasishaji kuhusu Saratani ya Figo kwa Watoto

Mfululizo 5.7a

(Ugonjwa, Dalili, Matibabu, Msaada)


Ugonjwa 2

Dalili 3

Matibabu 3

Changamoto Zilizopo 4

Msaada 5





Uvimbe wa Wilms (hatua ya 4)
Tumbo na Mapafu

Saratani ya Figo kwa Watoto

Saratani ya Figo Utotoni

Uvimbe wa Wilms (Jina la Kitabibu: Nefroblastoma)

Ugonjwa

Nefroblastoma (inayojulikana kama uvimbe wa Wilms) ndiyo saratani ya figo inayopatikana zaidi kwa watoto na ni saratani ya nne kwa wingi kwa watoto kwa ujumla. Saratani 9 kati ya 10 za figo kwa watoto ni Wilms. Wakati wowote, zaidi ya watoto 190,000 duniani huathiriwa na ugonjwa huu. Ni saratani inayotokea kwenye figo za watoto, ikianzia katika seli changa za figo ambazo hazikukua kawaida kabla ya kuzaliwa. Seli hizi huongezeka bila udhibiti na kutengeneza uvimbe imara, kwa kawaida katika figo moja, ingawa wakati mwingine figo zote mbili huathiriwa.

Kwa watoto wengi wenye uvimbe wa Wilms, hakuna sababu ya wazi ya ugonjwa. Wakati mwingine huhusishwa na hitilafu za njia ya mkojo au kasoro nyingine za kuzaliwa. Tafiti ndogo kadhaa zimependekeza uhusiano kati ya baadhi ya mazingira na hatari kubwa ya Wilms, lakini matokeo yanakinzana.

Uvimbe unapokua unaweza kubadili muundo wa kawaida wa figo na kuenea kupitia damu au mfumo wa limfu, mara nyingi hadi mapafuni au tishu za karibu tumboni. Licha ya kukua kwa kasi, uvimbe wa Wilms kwa kawaida huitikia vizuri matibabu. Maendeleo ya huduma za saratani za watoto yamewezesha watoto wengi kuishi kwa muda mrefu.

> "Saratani ya figo ni ya nne kwa wingi miongoni mwa saratani za watoto"

Dalili

Uvimbe wa Wilms huathiri zaidi watoto wa miaka 3-4, lakini unaweza pia kuathiri vijana na wakati mwingine watu wazima. Huanzia kwenye figo, kisha hukua na kuwa mkubwa kuliko figo yenyewe. Kwa kawaida vyote viwili huhitaji kuondolewa. Katika hatua za baadaye, unaweza kuenea hadi mapafuni, kwenye ini na mifupa. Hatimaye unaweza kusababisha kifo.

Dalili hutofautiana, na kwa watoto wengi uvimbe hugunduliwa kabla dalili hazijawa kali. Ishara ya kawaida ni kuvimba au kuwa na bonge lisilo na maumivu tumboni, ambalo wazazi mara nyingi huona wanapomwogesha au kumvalisha mtoto. Dalili nyingine ni maumivu ya tumbo, homa, uchovu, kukosa hamu ya kula au kupungua uzito. Baadhi ya watoto hupata shinikizo la damu kwa sababu uvimbe huathiri figo; wengine hupata damu kwenye mkojo au mabadiliko ya kukojoa. Mara chache, saratani ikienea mapafuni inaweza kusababisha kikohozi cha kudumu au kupumua kwa shida. Kwa kuwa dalili hizi zinafanana na magonjwa mengine ya kawaida ya watoto, dalili zinazoendelea au zisizo za kawaida zinahitaji tathmini ya haraka ili kusaidia utambuzi wa mapema.



Matibabu

Ugonjwa una uwezekano mzuri wa kuishi ukigunduliwa mapema. Hata hivyo, kwa kusikitisha, watoto wengi hukaa miaka bila kugunduliwa na wanaogunduliwa kuchelewa hukabili matokeo mabaya. Mara nyingi huhitaji matibabu makubwa yanayoweza kuhatarisha maisha, yakiwemo dawa za saratani, mionzi na upasuaji, na bado wanaweza kuwa katika hatari ya kufariki.

Matibabu hupangwa kwa makini kwa kila mtoto na kwa kawaida huunganisha tiba mbalimbali zinazotolewa na timu ya saratani za watoto. Msingi ni upasuaji, mara nyingi kuondoa figo iliyoathiriwa pamoja na uvimbe, au upasuaji unaohifadhi figo kwa baadhi ya wagonjwa, hasa figo zote mbili zinapoathiriwa. Dawa za saratani huua seli zinazoweza kubaki baada ya upasuaji au, katika baadhi ya taratibu, hutolewa kabla ili kupunguza uvimbe na kufanya kuondolewa kwake kuwa salama zaidi. Aina ya dawa na muda wa tiba hutegemea hatua ya saratani na aina ya tishu za uvimbe. Mionzi hutumika katika hali fulani za hatari kubwa, kama hatua za juu au aina ya tishu yenye ubashiri mbaya, ili kupunguza kurudia kwa ugonjwa. Kwa matibabu ya kisasa, watoto wengi hupona. Huduma za muda mrefu hufuatilia kurudia kwa ugonjwa na kudhibiti madhara ya baadaye huku zikisaidia ukuaji na maendeleo yenye afya.

> "Uwezekano wa kuishi ni mzuri ugonjwa ukigunduliwa mapema"



Changamoto Zilizopo

Mbali na maumivu, huzuni na kutokuwa na uhakika wanakopitia watoto wengi, familia pia hukabili matatizo makubwa ya kifedha na kihisia. Asilimia 100 ya muda wao hutumika kumtunza mtoto kwa muda mrefu. Kushindwa kupata mapato husababisha matatizo ya kifedha kuongezeka pamoja na msongo wa ugonjwa wa mtoto. Hata gharama muhimu zaidi za maisha zinaweza kuwa changamoto kubwa.

> "Hata gharama muhimu zaidi za maisha huwa changamoto kubwa"

Sekta ya afya pia hukabili gharama kubwa za kushughulikia ugonjwa huu. Matibabu ya wagonjwa walio katika hatua za baadaye huweka mzigo mkubwa kwa bajeti za watoto, kwa saa za kazi na fedha. Kwa kulinganisha, utambuzi wa mapema ni wa haraka na wenye gharama ndogo: unahusisha vipimo vya damu pamoja na uchunguzi wa mawimbi ya sauti kwa watoto wanaoonekana kuwa hatarini.



Msaada

Matibabu ya uvimbe wa Wilms yanapaswa, inapowezekana, kusimamiwa katika kituo cha saratani za watoto au programu maalumu ya uvimbe wa figo.

Timu kuu ya matibabu kwa kawaida hujumuisha:

- Daktari wa saratani za watoto (dawa za saratani na usimamizi wa jumla);
- Daktari wa upasuaji wa watoto au saratani za mfumo wa mkojo (kuondoa uvimbe);
- Daktari wa tiba ya mionzi (ikihitajika);
- Daktari wa figo (kufuatilia utendaji wa figo);
- Wauguzi bingwa wa saratani;
- Wataalamu wa huduma za muda mrefu baada ya matibabu.

Matibabu yanayofaa ni muhimu kwa sababu kiwango cha kuishi kwa Wilms kinazidi 85-90% katika programu zilizoendelea, na matokeo huwa bora zaidi katika vituo maalumu. Familia ziwasiliane mara moja na timu ya afya mgonjwa akipata:

- Homa wakati wa dawa za saratani;
- Kuvimba au maumivu ya ghafla;
- Matatizo ya kupumua;
- Uchovu mkali;
- Msongo wa kihisia au sonona.



> "Matibabu yanayofaa ni muhimu: kiwango cha kuishi kwa uvimbe wa Wilms kinazidi 85-90% katika programu zilizoendelea"





Wakfu wa Saratani ya Wilms

Simu: +1 (778) 514 5000
Barua pepe: info@WilmsFoundation.org
Tovuti: www.WilmsFoundation.org
Anwani: Suite 2147, 712 H Street NE, Washington DC, United States, 20002.

Wakfu wa Saratani ya Wilms, WCF na kaulimbiu "Kushinda Saratani ya Figo kwa Watoto" na "Ugonjwa Ambao Hujawahi Kuusikia" ni alama za biashara za kimataifa za Wakfu wa Saratani ya Wilms na zinalindwa na hakimiliki. Maudhui na muundo wa hati: Wakfu wa Saratani ya Wilms. Haki zote zimehifadhiwa.

Kwa mujibu wa sheria za hakimiliki, hati hii hairuhusiwi kunakiliwa, kurudufiwa, kutolewa upya au kutafsiriwa, yote au sehemu, bila idhini ya maandishi ya Wakfu wa Saratani ya Wilms.

Marekani: Shirika lisilotozwa kodi la 501(c)(3) | EIN:98-3478827 | Kanada: Shirika la hisani: 756261939BC0001

© Hakimiliki | Wakfu wa Saratani ya Wilms | Haki Zote Zimehifadhiwa

© Shirika la Afya Duniani (WHO). Imetumika kwa ruhusa kwa ushirikiano na Wakfu wa Saratani ya Wilms (WCF). CureAll ni sehemu ya Mpango wa Kimataifa wa WHO wa Saratani za Watoto (GICC). WHO haiidhinishi shirika, bidhaa au huduma yoyote maalumu.

© Hakimiliki | Wakfu wa Saratani ya Wilms | Haki Zote Zimehifadhiwa