
维尔姆斯瘤全球影响地图

生存差距。治疗可及性。每个孩子都重要。

维尔姆斯瘤是最常见的儿童肾癌。及时诊断、完整治疗和随访可带来很高的治愈率。



各国/地区
五年生存率

70–97% 高收入	61–94% 中高收入	0–85% 中低收入	25–53% 低收入	无数据
许多地区生存率达90%或以上。	可获得良好结果；可及性和完成治疗至关重要。	差异较大，取决于能力、费用和治疗完成情况。	诊断较晚、服务有限、药物短缺和放弃治疗。	数据不足、不可获得或未报告。

我们的目标
缩小差距：强化系统，确保公平获取服务，不让任何孩子掉队。

早期诊断与转诊 | 药物可及性 | 优质手术与病理服务 | 放疗可及性 | 完成治疗与支持 | 随访与长期照护

来源：美国NCI PDQ（2025）；加拿大癌症协会（2022至2023）；Nakata等（2020）；世卫组织儿童癌症倡议；CONCORD Cancer；SIOP-PODC指南；非洲维尔姆斯瘤合作项目。

注：生存率范围依据收入组相关文献。缺乏登记数据时，各国数据可能采用模型估算。

了解儿童肾癌的生存情况

资料简报系列2.3b（维尔姆斯瘤全球影响地图）

维尔姆斯瘤是第四常见的儿童癌症，也是最常见的儿童肾癌，但它是最容易治疗的癌症之一：如果儿童能够获得早期诊断、专科治疗和全面随访照护，许多高收入国家的生存率超过90%。然而，全球各地的生存结果差异显著，一些低收入和中等收入国家的儿童在诊断、治疗可及性、支持性照护和长期康复服务方面仍面临重大障碍。因此，儿童的出生地点可能极大影响其战胜儿童肾癌的机会。

根据版权法，未经维尔姆斯癌症基金会书面同意，不得复制、转载或翻译本文件。© 版权所有 | 维尔姆斯癌症基金会 | 保留所有权利。

资料简报系列2.3b（维尔姆斯瘤全球影响地图）

维尔姆斯癌症基金会（WCF）

维尔姆斯癌症基金会（WCF）是一家慈善组织，支持受儿童肾癌（尤其是通常称为维尔姆斯瘤的肾母细胞瘤）影响的儿童、家庭和医疗机构，并代表他们表达需求。其使命是建立涵盖宣传、教育、权益倡导、早期发现、治疗及支持的国际项目，以应对疾病的蔓延。

本基金会指南仅供教育用途，依据加拿大、美国和欧洲的国际儿童肿瘤诊疗标准编写。如有疑虑或问题，请咨询具备资质的医疗专业人员。

© 世界卫生组织（WHO）。经许可，与维尔姆斯癌症基金会（WCF）合作使用。CureAll 是世界卫生组织全球儿童癌症倡议（GICC）的一部分。世界卫生组织不为任何特定组织、产品或服务背书。

© 版权所有 | 维尔姆斯癌症基金会 | 保留所有权利。