

Wakfu wa Saratani ya Wilms

Shirika lisilotozwa kodi chini ya 501(c)(3) (EIN: 98-3478827)
712 H Street NE, Suite 2147, Washington DC, Marekani, 20002

info@WilmsFoundation.org | +1 (778) 514 5000

© Shirika la Afya Duniani (WHO). Imetumika kwa ruhusa kwa kushirikiana na Wakfu wa Saratani ya Wilms (WCF). CureAll ni sehemu ya Mpango wa Kimataifa wa WHO wa Saratani za Watoto (GICC). WHO haiidhinishi shirika, bidhaa au huduma yoyote mahususi.

www.WilmsFoundation.org



Wakfu wa Saratani ya Wilms

Kushinda Saratani ya Figo kwa Watoto

Sisi ni Nani

Wakfu wa Saratani ya Wilms (WCF) ni shirika la hisani lililoanzishwa kwa msukumo wa William Hodgkinson wa miaka tisa, kusaidia na kuwakilisha mahitaji ya watoto, familia na mashirika ya huduma za afya yaliyoathiriwa na saratani ya figo ya utotoni inayoitwa Wilms.



Lengo

Kuanzisha mpango wa kimataifa wa uhamasishaji, elimu, utetezi, utambuzi wa mapema na matibabu, na kuwasaidia watoto, familia na watoa huduma za afya ili kupunguza mzigo wa kihisia na kifedha wanaokabiliana nao kila siku wanapopambana na ugonjwa huu.



Wilms ni Nini?

Nefroblastoma (inayojulikana kama uvimbe wa Wilms) ndiyo aina ya saratani ya figo inayowapata watoto zaidi, na ni saratani ya nne kwa wingi kwa watoto kwa ujumla. Wakati mwingine huhusishwa na hitilafu za njia ya mkojo au kasoro nyingine za kuzaliwa. Mara nyingi huwapata watoto wenye umri hadi miaka mitano, lakini pia inaweza kuwapata watoto wakubwa, vijana na wakati mwingine watu wazima.

Uvimbe huanza kukua kwenye figo, lakini baadaye huwa mkubwa kuliko figo yenyewe. Kwa kawaida, uvimbe na figo huhitaji kuondolewa. Katika hatua za baadaye, Wilms inaweza kusambaa hadi mapafuni, kwenye ini na mifupa, na inaweza kusababisha kifo. Uwezekano wa kuishi ni mzuri ikigunduliwa mapema. Hata hivyo, watoto wengi hukaa miaka bila kutambuliwa na hukabiliwa na matokeo mabaya, mara nyingi wakihitaji matibabu makubwa yanayoweza kuhatarisha maisha, kama tiba ya dawa za saratani, mionzi au upasuaji.

Jinamizi la Kila Mzazi

Akilalamika tu kuwa anaumwa tumbo njiani kwenda shuleni, William aligunduliwa na saratani ya Wilms ya hatua ya 4/5 akiwa na miaka saba tu. Alikuwa mtoto mchangamfu, lakini vipimo vilionyesha uvimbe mkubwa kwenye figo na vivimbe vingine tisa mapafuni. Alitibiwa kwa mwaka mmoja, akafanyiwa upasuaji kadhaa na kupata tiba ya dawa za saratani na mionzi kwa muda mrefu. Hatimaye alishinda hali hiyo ngumu, lakini saratani ilirudi mara kadhaa, huku vivimbe vipya vikijitokeza. Hali hii ilisababisha kuhitajika kwa upandikizaji wa seli shina wenye hatari kubwa.

Utambuzi wa mapema ungezuia maumivu, msongo na huzuni hii, pamoja na mzigo usio wa lazima kwa mifumo ya huduma za afya.

Hatua za Wilms: Uhai baada ya Miaka 5

Asilimia (Anaplasia iliyoenea)

Hatua I	Hatua II	Hatua III	Hatua IV	Hatua V
78%	83%	60%	38%	68%

Msaada

Watoto kama William hawapaswi kukabiliwa na hali zinazohatarisha maisha wakiwa wadogo hivi; na si lazima iwe hivyo! Wilms ni mojawapo ya saratani za watoto zinazotibika zaidi ikigunduliwa mapema, lakini huwa tata sana ikigunduliwa kwa kuchelewa.





Fursa

Kupitia programu nyingi za WCF, tunaweza kupunguza mzigo wa kihisia na kifedha unaowakumba watoto, familia na watoa huduma za afya katika hali hizi. Hata hivyo, hatuwezi kufanya hivyo peke yetu. Tunategemea msaada wa watu binafsi na mashirika ili kutoa huduma zetu.

