
Tumor de Wilms: impacto global

Desigualdade na sobrevivência. Acesso ao tratamento. Cada criança conta.

Wilms é o cancro renal infantil mais comum. É altamente curável com diagnóstico atempado, tratamento completo e seguimento.



América do Norte e Europa

- Maior sobrevivência (70–97 %)
- Oncologia pediátrica completa
- Bom diagnóstico, cirurgia e cuidados de suporte

Ásia

- Grande variação (0–94 %)
- Bons resultados nos centros
- Barreiras rurais e financeiras

América Latina

- Grande variação (61–97 %)
- Melhor acesso, ainda desigual
- Melhores resultados urbanos do que rurais

Médio Oriente e Norte de África

- Resultados intermédios (61–90 %)
- Especialistas em alguns países
- Acesso varia por região

África Subsariana

- Menor sobrevivência (25–53 %)
- Diagnóstico tardio frequente
- Falta de medicamentos
- Muito abandono do tratamento

Sobrevivência aos 5 anos por país / região

70–97%
Rendimento elevado

Em muitas regiões, sobrevivem 90 % ou mais.

61–94%
Rendimento médio-alto

Bons resultados possíveis; acesso e conclusão do tratamento são essenciais.

0–85%
Rendimento médio-baixo

Grande variação segundo capacidade, custos e conclusão do tratamento.

25–53%
Rendimento baixo

Diagnóstico tardio, serviços limitados, falta de medicamentos e abandono.

Sem dados

Dados insuficientes, indisponíveis ou não comunicados.

O nosso objetivo

Reduzir a desigualdade: reforçar sistemas, garantir acesso equitativo e não deixar nenhuma criança para trás.

- Diagnóstico precoce e referenciação
- Acesso a medicamentos
- Cirurgia e patologia de qualidade
- Acesso à radioterapia
- Conclusão do tratamento e apoio
- Seguimento e cuidados duradouros

Fontes: U.S. NCI PDQ (2025); Canadian Cancer Society (2022–2023); Nakata et al., 2020; Iniciativa da OMS para o Cancro Infantil; CONCORD Cancer; orientações SIOP-PODC; Collaborative Wilms Tumour Africa Project.

Nota: os intervalos de sobrevivência baseiam-se na literatura por grupo de rendimento. Na ausência de registos, os dados nacionais podem ser modelados.

Compreender a sobrevivência ao cancro renal infantil

Série 2.3b (Mapa do impacto global do tumor de Wilms)

O tumor de Wilms é o quarto cancro infantil mais frequente e o cancro renal mais comum nas crianças. É um dos cancros mais tratáveis: em muitos países de rendimento elevado, a sobrevivência supera 90 % quando existem diagnóstico precoce, tratamento especializado e seguimento completo. Contudo, os resultados variam muito no mundo. Em alguns países de rendimento baixo e médio, persistem grandes barreiras ao diagnóstico, tratamento, cuidados de suporte e seguimento a longo prazo. O local de nascimento pode, assim, influenciar fortemente as possibilidades de sobrevivência.

Este documento não pode ser copiado, reproduzido ou traduzido sem autorização prévia por escrito da Wilms Cancer Foundation. © Copyright | Wilms Cancer Foundation | Todos os direitos reservados.

Wilms Cancer Foundation (WCF)

A Wilms Cancer Foundation (WCF) é uma organização de beneficência que apoia e representa as necessidades de crianças, famílias e organizações de saúde afetadas pelo cancro renal pediátrico, em particular o nefroblastoma, conhecido como tumor de Wilms. A sua missão é criar um programa internacional de sensibilização, educação, defesa de direitos, deteção precoce, tratamento e apoio para combater a propagação da doença.

Este guia da WCF destina-se apenas a fins educativos. Baseia-se em normas internacionais de oncologia pediátrica do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa. Consulte um profissional de saúde qualificado se tiver dúvidas ou preocupações.

© Organização Mundial da Saúde (OMS). Utilizado com autorização, em colaboração com a Wilms Cancer Foundation (WCF). CureAll faz parte da Iniciativa Global da OMS para o Cancro Infantil (GICC). A OMS não recomenda nenhuma organização, produto ou serviço específico.

© Copyright | Wilms Cancer Foundation | Todos os direitos reservados.